

Plan de prophylaxie des maladies aviaires

Maladies	Produits utilisés	Unités	Quantité en CC	Primovaccination	Rappel / vaccins	Observations
Parasitoses						
Déparasitage interne et externe/vitamines	Déparasitant +vitamines	Dose	Voir notices	-	-	Eau de boisson
Newcastle ou peste aviaire	Newvac, Itanew, Avivac-I ₂ , etc...	Dose	0,5ml/sujet en IM ou SC	0,5ml/sujet (1 semaine)	0,5ml/sujet (4 semaines) et après chaque 3 mois	Prendre contact avec un spécialiste
La maladie de Gumboro	Gumbo L, IBDL, GM80	Dose	Vaccination collective dans l'eau de boisson	- Poussins d'une semaine : 1000 doses dans 12 L d'eau, -Jeunes sujets : 2 à 3 semaines : 1000 doses pour 7,5 à 12L d'eau. - Adultes : après un mois : 1000 doses pour 20L d'eau.	10 jours Idem -	Prendre contact avec un spécialiste

La variole	Diphtosec, Hiprapox	Dose	Scarification au niveau du bréchet ou de la cuisse ou transfixion de la membrane alaire	15 ^{ème} jour	95^{ème} jour	Prendre contact avec un spécialiste
La bronchite infectieuse	B1H120, Iber	Dose	Vaccination collective dans l'eau de boisson	- Poussins d'une semaine : 1000 doses dans 12 L d'eau, -Jeunes sujets : 2 à 3 semaines : 1000 doses pour 7,5 à 12L d'eau. - Adultes : après un mois : 1000 doses pour 20L d'eau.	10^{ème} jour Idem -	Prendre contact avec un spécialiste
Choléra aviaire	Lamdavax	Dose	0,5ml/sujet en IM	70 ^{ème} jours	95^{ème} jour	Prendre contact avec un spécialiste
Salmonellose/coryza A, B et C	Corumin, 4K,	Dose	0,5ml/sujet en IM	90 ^{ème} jour	130^{ème} jour (4^{ème} mois)	Prendre contact avec un spécialiste
Salmonellose/coryza A, B et C, Newcastle, Bronchite	Corumin7K		Idem	Idem	Idem	

Infectieuse, Syndrome chute de ponte						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--